

Einnahme der Arzneimittel der Mikroimmuntherapie



Nachstehend finden Sie allgemeine Informationen über die Medikamente der Mikroimmuntherapie. Lesen Sie bitte immer die Packungsbeilage Ihres Arzneimittels und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes/Therapeuten oder Apothekers.

Woraus bestehen die Arzneimittel der Mikroimmuntherapie und wofür dienen sie?

Die Arzneimittel der Mikroimmuntherapie enthalten niedrig dosierte Botenstoffe (u.a. Zytokine), die eine wichtige Rolle bei der Regulation der Immunantwort spielen. Diese Arzneimittel werden zur Unterstützung des Immunsystems im Bereich der Prävention bzw. Behandlung diverser Erkrankungen eingesetzt.

Was müssen Sie über die Arzneimittel von Labo'life wissen?

Es handelt sich um Arzneimittel, die ausschließlich in Apotheken erhältlich sind.

Es handelt sich um eine sequenzielle Behandlung: Die Arzneimittel sind derart konzipiert, dass der natürliche Rhythmus der Immunantwort nachgeahmt wird, die in zeitlich aufeinanderfolgenden Etappen abläuft. Die Zusammensetzung variiert demnach von Kapsel zu Kapsel, sodass die Einnahme in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen muss. Die Kapseln sind von 1 bis 10 nummeriert und folgen einem Farbverlauf, um Ihnen die sequenzielle Einnahme zu erleichtern.

Sie werden sublingual eingenommen: Jede Kapsel enthält Streukügelchen, die unter die Zunge gegeben werden, wo sie vollständig zergehen. Dadurch soll eine schnelle Aufnahme der Wirkstoffe über die Schleimhaut unter der Zunge gewährleistet werden, wo sie in direkten Kontakt mit den dortigen Immunzellen treten.

Wie nehmen Sie die Arzneimittel von Labo'life richtig ein?

Nehmen Sie eine der drei Blisterpackungen aus der Schachtel (alle darin enthaltenen Blister-packungen sind identisch).



Entnehmen Sie die Kapseln unter Einhaltung der Nummernfolge (die Kapseln sind von 1 bis 10 nummeriert, wobei mit Kapsel 1 begonnen und in numerischer Reihenfolge bis 10 fortgefahren wird). Wenn die erste Blisterpackung aufgebraucht ist, fahren Sie mit Kapsel 1 der nächsten Blisterpackung fort und so weiter, bis die Schachtel leer ist.



Schlucken Sie nicht die gesamte Kapsel hinunter. Öffnen vorsichtig die Kapsel, indem Sie den oberen Teil der Kapsel durch leichtes Eindrücken und Drehen



Geben Sie den Kapselinhalt unter die Zunge und lassen Sie diesen dort zergehen. Das kann einige Minuten in Anspruch nehmen.



Was ist die empfohlene Dosierung und die Art der Anwendung?

Die empfohlene Dosierung beträgt ein Kapselinhalt pro Tag. Die Arzneimittel sollten mit einem Abstand von mind. 15-30 Minuten vor oder 1 Stunde nach dem Verzehr von Nahrungsmitteln oder Getränken sowie der Anwendung von Minzprodukten verabreicht werden.

Die Dosierung kann von Ihrem Arzt/Therapeuten oder Apotheker, je nach Ihrem Gesundheitszustand, geändert und angepasst werden. Bei der Verschreibung mehrerer Kapseln sollten die Einnahmen über den Tag verteilt werden – getrennt von Mahlzeiten und mit einem Abstand von mindestens 2 Stunden zwischen den Finnahmen.

Wie lange dauert die Behandlung?

Dies hängt vom Zustand Ihres Immunsystems ab. Ihr Arzt/Therapeut kann Ihnen die Arzneimittel für einige Wochen oder mehrere Monate verschreiben.

Gibt es Kontraindikationen oder Vorsichtsmaßnahmen?

Kontraindikationen: Die Arzneimittel dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile der Arzneimittel sind.

Vorsichtsmaßnahmen: Die Arzneimittel enthalten Saccharose. Bitte nehmen Sie diese Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Welche Wechsel- oder Nebenwirkungen sind möglich?

Wechselwirkungen: Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt. Vermeiden Sie Arzneimittel auf Minzbasis eine Stunde vor der Einnahme dieser Arzneimittel.

Mögliche Nebenwirkungen: Wie alle Arzneimittel können auch diese Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In Ausnahmefällen kann bei der Einnahme auf nüchternen Magen eine Dyspepsie (Verdauungsstörung) auftreten. In diesem Fall werden die Streukügelchen 1 Stunde nach der Mahlzeit eingenommen.

Ich habe die gesamte Kapsel geschluckt. Ist es ein Problem?

Die Kapseln erfüllen die pharmazeutischen Qualitätsstandards und sind identisch mit denen von Arzneimitteln, die zum Schlucken bestimmt sind. Sie werden auf normale Weise verdaut. Jedoch verhindert die äußere Kapsel die Wirkung dieser Arzneimittel. Sollten Sie die gesamte Kapsel geschluckt haben anstatt sie zu öffnen, nehmen Sie die nächste Kapsel und geben Sie deren Inhalt unter die Zunge.

Ich habe die Einnahme einer Kapsel vergessen bzw. übersprungen. Was soll ich tun?

Setzen Sie die Behandlung ab der zuletzt eingenommenen Kapsel fort. Verabreichen Sie nicht zum Ausgleich zwei Kapseln und halten Sie stets die Nummernfolge ein.



Wir haben unser Design anlässlich des 30. Geburtstags erneuert. Während einer Übergangszeit werden die Verpackungen noch im alten Design vertrieben, bis sie nach und nach von den neuen Verpackungen abgelöst werden.



Die Arzneimittel von Labo'life sind ausschließlich in Apotheken erhältlich.

Haben Sie weitere Fragen zu den Arzneimitteln der Mikroimmuntherapie? Besuchen Sie unsere Website.



Labo'life Belgium Av. d'Ecolys 2 bte 36

5020 Namur <u>Belgien</u> Deutschland: 0800 18 26 215 Österreich: 0800 29 66 41 Schweiz: 0800 56 21 17 service-de@labolife.com www.labolife.com





