labo'life
micro-immunotherapy

Médicaments de micro-immunothérapie

EN QUOI CONSISTENT LES MÉDICAMENTS DE MICRO-IMMUNOTHÉRAPIE ET À QUOI SERVENT-ILS ?

Les médicaments de micro-immunothérapie sont des **traitements immunomodulateurs** adaptés à la pratique médicale quotidienne. Ils contiennent de faibles doses de médiateurs (entre autres des cytokines) qui jouent un rôle important dans la régulation de la réponse immunitaire. Ils sont destinés à **soutenir la fonction immunitaire** aussi bien de manière préventive que thérapeutique.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR SUR LES MÉDICAMENTS DE LABO'LIFE ?

Ils sont **disponibles exclusivement en pharmacie**.

Il s'agit d'un **traitement séquentiel** : ces médicaments sont conçus de manière à reproduire le rythme naturel de la réponse immunitaire qui se déroule en étapes successives. La composition varie donc d'une gélule à l'autre, de sorte que la prise doit se faire dans un ordre précis. Pour faciliter la prise et éviter toutes erreurs, les gélules sont numérotées de 1 à 10 et suivent une échelle de couleurs.

L'administration est sublinguale : chaque gélule contient des granules qui doivent être versés sous la langue jusqu'à dissolution complète. La muqueuse sublinguale étant perméable et dotée de caractéristiques immunologiques, elle permet une absorption rapide des substances actives et un contact direct avec les cellules immunitaires.

QUELLES SONT LA POSOLOGIE ET LES CONDITIONS DE PRISE ?

La posologie recommandée est **d'1 gélule par jour**. Elle

peut être modifiée et adaptée par votre médecin ou pharmacien en fonction de votre état de santé.

Il est conseillé de prendre ces médicaments en respectant un intervalle **d'au moins 15 à 30 minutes avant ou après l'ingestion d'aliments ou de boissons**. En cas de prescription de plusieurs gélules par jour, veuillez répartir les prises au cours de la journée, en dehors des repas et en respectant un intervalle d'au moins 2 heures entre chaque prise.

QUELLE EST LA DURÉE HABITUELLE DU TRAITEMENT ?

Elle dépendra du dysfonctionnement du système immunitaire et pourra s'étendre **sur une période de quelques semaines à plusieurs mois**.

QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONS ET LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ?

Contre-indications : ne prenez jamais ces médicaments si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ces médicaments.

Précautions d'emploi : ces médicaments contiennent du saccharose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ces médicaments.

EXISTE-T-IL DES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET DES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Interactions médicamenteuses : aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récem-

ment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Effets indésirables : comme tous les médicaments, ces médicaments peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. De façon exceptionnelle, il peut apparaître une dyspepsie (troubles digestifs) lors des prises à jeun. Dans ce cas, la prise des granules se fera 1 heure après le repas. Par ailleurs, une impression d'aggravation des symptômes peut éventuellement survenir, mais elle disparaît généralement après quelques jours. Si cette impression perdure, consultez votre médecin ou pharmacien.

QUE FAIRE SI J'AI AVALÉ LA GÉLULE AU LIEU DE L'OUVRIR ?

La gélule utilisée répond aux normes de qualité des médicaments destinés à être avalés et elle est bien digérée. Cependant, elle empêche l'action des substances actives du médicament lorsqu'elle est ingérée.

Si vous avez avalé la gélule entière au lieu de l'ouvrir, prenez la gélule suivante en versant son contenu sous la langue.

QUE FAIRE SI J'AI OUBLIÉ DE PRENDRE LA GÉLULE OU JE ME SUIS TROMPÉ(E) DANS L'ORDRE DE PRISE ?

Si vous avez oublié de prendre une gélule ou si vous vous êtes trompé(e) dans l'ordre de prise, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée. Continuez de prendre le traitement à partir de la dernière gélule prise.

COMMENT PRENDRE LES MÉDICAMENTS DE LABO'LIFE ?

1. **Sortez une des trois plaquettes** de la boîte (toutes les plaquettes sont identiques).



2. **Prenez une gélule** et **suivez l'ordre de numérotation** (les gélules sont numérotées de 1 à 10, commencez par la gélule 1, puis la 2 et allez jusqu'à 10). À la fin de la première plaquette, continuez avec la gélule 1 de la plaquette suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la boîte.



3. **Ouvrez la gélule** avec soin en soulevant la tête (pincez et tournez légèrement la partie supérieure).

   Il ne faut pas avaler la gélule entière.

4. **Versez le contenu de la gélule** (granules) **sous la langue** et laissez-le fondre (cela peut prendre quelques minutes).

Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice et demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

labo'life
micro-immunotherapy

Nous avons changé notre image !
Découvrez notre nouvelle identité visuelle

Ancienne boîte*

=

Nouvelle boîte*

**Deux modèles différents de boîtes peuvent encore coexister sur le marché*

Nos médicaments sont vendus exclusivement en pharmacie.

Vous souhaitez en savoir plus ?

monsystemeimmunitaire.fr

Labo'life Belgium
N° d'autorisation : 1507H
Av. d'Ecolys 2 bte 36
5020 Namur
Belgique

Tel. + 32 (0) 81 40 87 81
contact@labolife.com

www.labolife.com

Labo'life Belgium © 2025